

بعد از کشیدن دندان ها و علمیات

پن‌دیدیگ/ورم: بعضاً وجود از طریق ورم نمودن ساحة زخم، از خود عکس العمل نشان میدهد. این موضوع میتواند باز نمودن دهن را اندکی بیشتر از حد معمول مشکل سازد. پن‌دیدیگ/تورم و مشکل باز نمودن دهن به تدریج بهتر خواهد شد و به کلی از بین خواهد رفت.

درد: این امکان وجود دارد که شما احساس درد نموده و دهن تان برای چند روز درد داشته باشد. این درد به تدریج کاهش خواهد یافت. در صورت نیاز میتوانید درد را با تابلیت های ضد درد تسکین بدهید.

با ما تماس بگیرید:

- در صورتی که خونریزی قطع نشود یا اگر خونریزی بعد از یک مدت دوباره آغاز گردد.
- اگر پن‌دیدیگ/تورم و مشکل گشودن دهن کاهش نیابد.
- اگر در هنگام قورت نمودن یا نوشیدن با مشکلات روبرو شوید.
- اگر درد کاهش نمی یابد.
- اگر شما تب میکنید.

بعد از کشیدن یک دندان یا انجام دادن یک علمیات دیگر در دهن، نکاتی وجود دارد که باید آنها را به خاطر داشته باشید.

- قبل از آن که بی حسی خاتمه یابد از آب کشیدن دهن، خوردن چیزی و یا سگری کشیدن خودداری کنید. حداقل یک ساعت صبر کنید.
- در جریان یک ساعت بعد از علمیات محل زخم را مستقیماً بُرس نکنید. در غیر آن میتواند مانند همیشه بُرس نماید.
- از مکیدن زخم یا لمس نمودن آن با زبان خودداری کنید! چیزی را داخل زخم نکنید حتی اگر چنین نیز احساس شود که گویا چیزی در داخل آن گیر مانده است.

مشکلات بعدی

خونریزی: معمولاً زخم همیشه بعد از تداوی اندکی خونریزی میکند. این یک موضوع کاملاً نورمال بوده و اصلاً قابل تشویش نمی باشد. در صورتی که خونریزی طول بکشد، تا زمان متوقف شدن آن میتوانید از همان (بنداز/باند زخم بندی) که از ما بدست آورده اید، استفاده نمایید. بنداز/باند زخم بندی را با آب شیرگرم مرطوب ساخته و آن را برای مدت تقریباً 15 دقیقه زیر دندان بگیرید.

